

ФАГОГИН

гель с бактериофагами
для интимной гигиены

АННОТАЦИЯ

Назначение

Гель с бактериофагами для интимной гигиены «Фагогин» (далее – **Фагогин**) применяют с целью нормализации микрофлоры интимной сферы. **Фагогин** способствует предотвращению развития бактериальных инфекций органов интимной сферы. **Фагогин** содержит комплекс из 74 видов бактериофагов из коллекции ООО НПЦ «Микромир», подавляющих рост актуальных штаммов патогенных бактерий:

- *Staphylococcus aureus* spp.
- *Staphylococcus epidermidis* spp.
- *Staphylococcus hominis*
- *Staphylococcus warneri*
- *Staphylococcus haemolyticus*
- *Staphylococcus capitis*
- *Staphylococcus caprae*
- *Staphylococcus succinus*
- *Gardnerella vaginalis*
- *Pseudomonas aeruginosa* spp.
- *Klebsiella* spp.
- *Proteus vulgaris* spp.
- *Proteus mirabilis* spp.
- *Escherichia coli* spp.
- *Actinomyces* spp.
- *Streptococcus agalactiae*
- *Streptococcus pyogenes* Д. spp.
- *Enterobacter* spp.
- *Enterobacter kobai*
- *Enterobacter cloacae*
- *Prevotella* spp.
- *Enterococcus faecalis*
- *Acinetobacter baumannii*
- *Stenotrophomonas maltophilia*
- *Citrobacter freundii*
- *Propionibacterium acne*

Практика применения бактериофагов

Бактериофаги (с др.-гр. – «пожиратели бактерий») – вирусы, избирательно поражающие бактерии: каждый вид бактериофагов активен только в отношении определённого вида бактерий и нейтрален в отношении других видов. В клинической практике используются бактериофаги, которые уничтожают патогенные бактерии, не нарушая нормофлору человека и не взаимодействуя с его органами и системами. Это позволяет применять их у всех категорий пациентов (включая новорожденных, беременных и кормящих женщин) как эффективное и безопасное антибактериальное средство профилактики и терапии, а также в комбинации с антибиотиками. («Принципы использования бактериофагов для борьбы с инфекциями связанными с оказанием медицинской помощи. Методические рекомендации». М., 2014). Особую актуальность имеет профилактическое применение бактериофагов в тех случаях, когда клинические признаки бактериального инфицирования отсутствуют, но существует риск их появления. В результате применения бактериофагов уничтожаются патогенные бактерии, поддерживается нормальный баланс микрофлоры.

Форма выпуска

Гель во флаконе 50 мл с дозатором и защитным колпачком.

Состав

- Активные вещества: стерильная суспензия фаговых частиц в физиологическом растворе.
- Вспомогательные вещества: вода очищенная, карбопол, экстракт календулы, катон.

Рекомендации по применению

- В комплексе самостоятельных гигиенических процедур по уходу за органами интимной сферы мужчин и женщин, с целью нормализации микрофлоры.
- Способствует предотвращению развития бактериальных инфекций органов интимной сферы у мужчин и женщин при наличии факторов риска: сахарного диабета, онкологических заболеваний (при проведении лучевой и химиотерапии), сниженном местном и общем иммунитете.
- Способствует предотвращению развития бактериальных инфекций интимной сферы у мужчин и женщин при различного рода поражениях, травмах.
- Как средство ухода в составе комплексного лечения бактериальных воспалительных заболеваний органов интимной сферы и их рецидивов у женщин: вагинита, бактериального вагиноза, цервицита, неспецифического экзо- и эндоцервицита, посткоитального цистита.
- Способствует предотвращению развития бактериальных воспалительных заболеваний органов интимной сферы, связанных с восходящей инфекцией мочеполовых путей и их рецидивов.
- Способствует санации полового партнера.
- Способствует предотвращению развития бактериальных осложнений в урологии, акушерстве и гинекологии, при подготовке и в процессе хирургического вмешательства и иных лечебных манипуляциях, при осложнениях в послеоперационном и послеродовом периоде.
- По назначению врача в других клинических ситуациях, при которых важно обеспечить высокую антибактериальную защиту и отсутствие побочных эффектов.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам **Фагогина**.

Способ применения

- В домашних условиях **Фагогин** наносят на интимные участки тела. Остатки **Фагогина** не смывать в течение 40 минут после применения.
- В условиях приёма специалиста **Фагогином** обрабатывают поражённые или травмированные участки интимных органов после проведения лечебных манипуляций или хирургических вмешательств.

ВАЖНО! Не вносить **Фагогин** в закрытые очаги воспаления, не имеющие или имеющие ограниченный отток экссудата из очага (например, ушитые раны и т. п.). Внесение **Фагогина** в такие очаги может привести к выраженному обострению воспалительного процесса и/или отёкам и/или лимфостазу.

Способ применения и дозы

- В комплексе самостоятельных гигиенических процедур по уходу за органами интимной сферы с целью нормализации микрофлоры:
2–3 мл **Фагогина** (два-три нажатия) 1–2 раза в день после гигиенических мероприятий.
Длительность применения **Фагогина** как средства ухода за интимной сферой целых не ограничена.
- Способствует предотвращению развития бактериальных инфекций органов интимной сферы у мужчин и женщин при наличии факторов риска: сахарного диабета, онкологических заболеваний (при проведении лучевой и химиотерапии), сниженном местном и общем иммунитете:
2–3 мл **Фагогина** (два-три нажатия) 2–3 раза в день после гигиенических мероприятий.
Длительность применения **Фагогина** как средства ухода за интимной сферой не ограничена.
- Способствует предотвращению развития бактериальных инфекций интимной сферы у мужчин и женщин при различного рода поражениях, травмах:
2–3 мл **Фагогина** (два-три нажатия) 2–3 раза в день после гигиенических мероприятий до исчезновения признаков поражения, травмы.
Далее рекомендуется схема применения для повседневного ухода.
- Как средство ухода в составе комплексного лечения бактериальных воспалительных заболеваний органов интимной сферы и их рецидивов у женщин; вагинита, бактериального вагиноза, цервицита, неспецифического экзо- и эндоцервицита:
1–3 мл (одно-три нажатия) 2–4 раза в день (в зависимости от интенсивности воспалительного процесса) после гигиенических мероприятий в течение 7 дней, далее 1–3 мл (одно-три нажатия) 2 раза в день после гигиенических процедур в течение 7 дней.
- Способствует предотвращению развития бактериальных воспалительных заболеваний органов интимной сферы, связанных с восходящей инфекцией мочеполовых путей и их рецидивов.
Доза **Фагогина** определяется врачом, исходя из клинической ситуации. **Фагогин** наносят после проведения гигиенической обработки и лечебных манипуляций до исчезновения клинических признаков. Рекомендуется сочетать с применением в домашних условиях: 2–3 мл **Фагогина** (два-три нажатия) 2–3 раза в день после гигиенических мероприятий в течение 7–14 дней.
- Способствует санации полового партнера.
2–3 мл **Фагогина** (два-три нажатия) наносить 2 раза в день после гигиенических мероприятий на головку полового члена. При смене партнера до и после интимной близости.
- Способствует предотвращению развития бактериальных осложнений в урологии, акушерстве и гинекологии, при подготовке и в процессе хирургического вмешательства, иных лечебных манипуляциях, в послеоперационном и послеродовом периоде:
Перед хирургическим вмешательством – не менее 2 мл (двух нажатий) в течение 7 дней после гигиенических мероприятий. После хирургического вмешательства – не менее 2 мл (двух нажатий) в течение 7 дней после гигиенических мероприятий. Кратность и частота введения устанавливаются индивидуально врачом в зависимости от клинической ситуации.
- По назначению врача в других клинических ситуациях при которых важно обеспечить высокую антибактериальную защиту и отсутствие побочных эффектов:
Врач определяет схему применения, кратность и объём использования **Фагогина**, исходя из конкретной клинической ситуации.

ВАЖНО! На начальном этапе при наличии воспалительного очага рекомендуется более частое применение **Фагогина** с интервалом 1–2 часа до исчезновения клинических симптомов и болевых ощущений. Врач может изменить схему применения, кратность и объём использования **Фагогина** исходя из клинической ситуации.

Взаимодействие

- Антибактериальные препараты системного действия:
 - **Фагогин** можно применять одновременно с системной антибактериальной терапией.
- Антисептические, антибактериальные и другие препараты местного действия:
 - Допустимо совместное применение **Фагогина** с растворами хлоргексидина биглюконата 0,05 % и 0,2 %, гидроксиметилхиноксалиндиоксида 2,0 %, средствами с метронидазолом, мазями с хлорамфениколом и метилурацилом.
 - Допустимо последовательное применение **Фагогина** с интервалом не менее 20 минут после использования следующих средств:
 - на основе октенидина и феноксиэтанола;
 - на основе солей полиакриловой кислоты;
 - растворов перекиси водорода;
 - на основе повидон-йода.

Особые указания

Предохранять дозатор от попадания грязи и инородных веществ. Очищать носик дозатора и колпачок от остатков геля. После использования следует всегда закрывать дозатор защитным колпачком.

Условия транспортировки, хранения и срок годности

До начала использования допускается транспортировка при температуре от 2 °С до 25 °С в течение 14 суток. Хранить в сухом, защищённом от света месте при температуре от 2 °С до 8 °С в течение 24 месяцев. После начала использования допускается кратковременное хранение **Фагогина** при комнатной температуре (не более 25 °С) при условии соблюдения стерильности и использовании всего содержимого флакона в течение 60 дней. Тем не менее, в домашних условиях предпочтительным местом хранения **Фагогина** является холодильник.

Свидетельство о государственной регистрации

№ KZ.16.01.79.001.E.003055.10.13 от 30.10.2013 г., ТР ТС 009/2011.

Наименование изготовителя и его местонахождение

ООО «НВЦ Агроветзащита С.-П.», Россия, 141305, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1 для ООО НПЦ «Микромир», Россия, 107031, г. Москва, пер. Нижний Кисельный, д. 5/23, стр. 1.

Реквизиты организации, уполномоченной принимать претензии от потребителей

ООО НПЦ «Микромир», Россия, 107031, г. Москва, пер. Нижний Кисельный, д. 5/23, стр. 1.
Тел. 8 (495) 625 32 65. www.micromir.bio