

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата **ГРИППФЕРОН®**

Регистрационный номер

P № 000089/01

Торговое название препарата

Гриппферон®

Международное

непатентованное название или группировочное название

Интерферон альфа-2b

Лекарственная форма

Капли назальные

Состав

1 мл препарата содержит:

Действующее вещество:

интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный не менее 10000 МЕ.

Вспомогательные вещества:

динатрия эдетата дигидрат 0,5 мг, натрия хлорид 4,1 мг, натрия гидрофосфата додекагидрат 11,94 мг, калия дигидрофосфат 4,54 мг, повидон—8 тыс. 10 мг, макрогол 4000 100 мг, вода очищенная до 1 мл.

Описание

Прозрачный бесцветный или светло-желтый раствор.

Фармакотерапевтическая группа

Цитокин

Код АТХ L03AB05

Фармакологическое действие

Препарат обладает иммуномодулирующим, противовоспалительным и противовирусным действием.

Фармакокинетика

При интраназальном применении концентрация действующего вещества, достигаемая в крови, значительно ниже предела обнаружения (предел определения интерферона альфа-2b – 1–2 МЕ/мл) и не имеет клинической значимости.

Показания к применению

Профилактика и лечение гриппа и ОРВИ у детей и взрослых.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость препаратов интерферона и компонентов, входящих в состав препарата.

Тяжелые формы аллергических заболеваний.

Применение при беременности и лактации

Гриппферон® разрешен к применению в течение всего периода беременности в соответствии с возрастной дозой.

Способ применения и дозы

При первых признаках заболевания Гриппферон® применяют в течение 5 дней:

- в возрасте от 0 до 1 года по 1 капле в каждый носовой ход 5 раз в день (разовая доза 1000 МЕ, суточная доза 5000 МЕ);
- в возрасте от 1 до 3 лет по 2 капли в каждый носовой ход 3–4 раза в день (разовая доза 2000 МЕ, суточная доза 6000–8000 МЕ);
- в возрасте от 3 до 14 лет по 2 капли в каждый носовой ход 4–5 раз в день (разовая доза 2000 МЕ, суточная доза 8000–10000 МЕ);
- взрослым по 3 капли в каждый носовой ход 5–6 раз в день (разовая доза 3000 МЕ, суточная доза 15000–18000 МЕ).

С целью профилактики ОРВИ и гриппа:

- при контакте с больным и/или при переохлаждении препарат закапывают в разовой возрастной дозе 2 раза в день. При необходимости профилактические курсы повторяют;
 - при сезонном повышении заболеваемости препарат закапывают в возрастной дозе однократно утром с интервалом 24–48 часов.
- После каждого закапывания рекомендуется помассировать пальцами крылья носа в течение нескольких минут для равномерного распределения препарата в носовой полости.

Побочное действие

Аллергические реакции.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Применение интраназальных сосудосуживающих препаратов совместно с Гриппфероном® не рекомендуется, так как это способствует дополнительному высушиванию слизистой оболочки носа.

Форма выпуска

Капли назальные 10000 МЕ/мл. По 5 мл или 10 мл во флаконах пластиковые с дозатором-капельницей. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Срок годности

2 года. Вскрытый флакон хранить не более 30 дней.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

При температуре от 2°C до 8°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО «ФИРН М», 143390, Московская область, Наро-Фоминский район, п. Кокошкино, ул. Дзержинского, д. 4.

Адрес для направления претензий

ЗАО «ФИРН М», 127055, г. Москва, пл. Борьбы, 15/1, подъезд «В». Тел.: (495) 956-15-43, факс: (495) 956-13-30.