

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

РУЗАМ®

Регистрационный номер: ЛС-000791-251110

Торговое название препарата: РУЗАМ®

Лекарственная форма: раствор для подкожного введения

Состав:

Активное вещество: экстракт из культуры термофильного штамма золотистого стафилококка (*Staphylococcus aureus*, штамм С-2).

Вспомогательные вещества: раствор хлорида натрия для инъекции 0,9%, фенол 0,025-0,05%

Описание: Прозрачная бесцветная или слегка окрашенная жидкость с лёгким запахом фенола.

Фармакотерапевтическая группа: Противоаллергическое средство

Код АТХ: L03 AX

Фармакологические свойства:

Оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действие. Уменьшает отёк слизистых оболочек и кожи, снижает содержание эозинофилов и дегранулированных тучных клеток в очаге воспаления и повышает концентрацию секреторного иммуноглобулина класса А в слизистых оболочках, увеличивает тем самым сопротивляемость их к инфекции. Снижает содержание маркёров аллергического воспаления: общего иммуноглобулина класса Е в крови и оксида азота в выдыхаемом воздухе.

Показания к применению:

Сезонные (поллинозы) и круглогодичные аллергические риниты, бронхиальная астма, крапивница и отёк Квинке, атопический и другие аллергические дерматиты, частые респираторные инфекции.

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к препарату, беременность и период грудного вскармливания, детский возраст до 4 лет, острая инфекция, туберкулез в активной форме, декомпенсированные заболевания внутренних органов.

С осторожностью:

С осторожностью следует применять при наличии очагов хронической инфекции (хронический тонзиллит, синусит) из-за возможности их обострения.

Способ применения и дозы:

Подкожно взрослым и детям старше 6 лет по 0,2 мл 1 раз в неделю, детям от 4 до 6 лет по 0,1 мл 1 раз в неделю; курс 5-10 недель. В течение года может быть проведено от 1 до 4 курсов. При поллинозе препарат вводится за 6-8 недель до периода цветения аллергенного растения; при частых респираторных инфекциях профилактику следует проводить весной и осенью.

Побочное действие:

Повышение температуры тела до субфебрильных цифр, слабость, обострение хронического очага инфекции, кратковременное усиление кашля при хроническом бронхите, усиление высыпаний на коже при кожной аллергии. Эти симптомы, как правило, слабо выражены и преходящи, не требуют отмены препарата.

Передозировка:

Случаев передозировки не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Взаимодействия препарата РУЗАМ® с другими лекарственными средствами не зарегистрировано. РУЗАМ® может быть назначен вместе с антигистаминными, глюкокортикостероидными препаратами или антибиотиками.

Особые указания:

Препарат не оказывает влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автомобилем и др.)

Оставшийся в ампуле раствор не использовать.

Форма выпуска:

Раствор для подкожного введения по 0,2 мл или 0,5мл в ампулах из бесцветного или светозащищенного стекла. По 5 ампул в контурной ячейковой упаковке. По 1 или 2 контурные упаковки с ножом или скарификатором: ампульным (или без них), вместе с инструкцией по применению в пачке из картона.

Условия хранения:

В защищенном от света и не доступном для детей месте при температуре от 4 до 20° С

Срок годности:

4 года, не использовать позже срока, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек:

По рецепту врача.

Производитель:

ООО "РУЗАМ-М"

Россия 123154 г. Москва, бульвар генерала Карбышева, дом 5, корп. 2., офис 64.